

Análisis Garantizado

Calcio (Ca) 25,00%

Boro (B) 0,10%

Derivado de Carbonato de Calcio y Ácido Bórico

Peso Neto por Kilogramo: 1,64 Kg.

No almacenar a una temperatura menor de 4° C.

Contenido Neto

PH: 8,6

Información General

Fertilizante líquido indicado para aplicaciones al follaje y vía suelo. No utilizar equipamiento de Cobre y/o Aluminio.

Recomendaciones Generales

Aplicación al Follaje: Para una mayor absorción en la planta aplicar este product temprano en la mañana o tarde por la tarde.

Consulte con su asesor sobre información de variedades ó híbridos sensibles.

Precaución: este fertilizante contiene boro y su uso es sólo para los cultivos mencionados en esta etiqueta. El uso en cualquier otro cultivo no mencionado o bajo diferentes condiciones de aplicación, puede resultar en daños serios a su cultivo.

Manufacturado Para
D&M CHEM INC.
112 Charron Rd. Moxee, WA 98936



Calcio con Boro

Recomendaciones de Uso

D&M Chem Eclipse esta recomendado para la aplicación en los siguientes cultivos:

| | |
|----------|--------------|
| Ajo | Almendro |
| Cebolla | Arándanos |
| Melón | Ciruelos |
| Papa | Citricos |
| Pepino | Duraznos |
| Pimentón | Frambuesa |
| Poroto | Granados |
| Sandia | Manzanos |
| Tomate | Nectarines |
| Zapallo | Nogal |
| Olivos | Paltos |
| Pecano | Perales |
| | Uva Vinífera |

Frutales

Al Follaje: Mezclar 9,0-28,0 litros/ha con suficiente agua (buen Mojamiento)

Las aplicaciones deben comenzar antes de floración.

En aquellas especies en que es factible limpiar la fruta (lavado packing), continuar durante la cosecha con 9,0-28,0 litros/ha.

Hortalizas y chacras

Papas al follaje

Aplicar 9,0-28,0 litros/ha con suficiente agua (buen mojamiento)

Las aplicaciones deben comenzar antes de floración. Continuar las aplicaciones de 9,0-23,0 litros/ha hasta antes de que se remuevan las hojas.

Hortalizas de fruto

Aplicar 9, 0-28,0 litros/ha con suficiente agua (buen mojamiento) antes de que se forme la fruta.

Continuar las aplicaciones de 9,0-28,0 litros/ha hasta dos semanas antes de la cosecha.

Ostros cultivos y usos

Ornamentales

Aplicar solamente al suelo, utilizando regador o riego por goteo. Aplicar a intervalos regulaes.

Aplicaciones vía riego

Aplicar de 9,0 a 75 litros por hectárea con el agua de riego. Este product puede ser incorporado junto a los fertilizantes y/o pesticidas.

Aviso

D&M CHEM INC. Garantiza que este product se ajusta a la descripción química mencionada en la etiqueta y se ajusta razonablemente a los propósitos mencionados en la misma, solamente cuando es usado de acuerdo a las indicaciones bajo el uso en condiciones normales. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con este product, daño al cultivo, inefectividad y otras consecuencias no intencionadas pueden resultar a causa de factores como; condiciones de clima, la presencia de otros materiales, o la forma de uso o aplicación. Todo lo mencionado esta mas aya del control de D&M Chem. En ningún caso D&M Chem puede ser responsable por consecuencias o danos indirectos que resultan por el manejo de este product. Todos estos riesgos deben ser asumidos por el comprador. D&M Chem no hace garantías o se hace responsable del product o por la salud de algo en particular, o tampoco por cualquier otra garantía expresada o implícita except las ya indicadas.



Distribuido en Chile por ASP Chile S.A.
Burgos 80, oficina 402
Las Condes, Santiago.