

# Green Line

Fertilizers



## Nutrientes Foliare LEAFWELL

**FERTIPHOS M g**  
**0 -25-0**

**NUTRIENTE FOLIAR DISPERSABLE EN AGUA**

### ANALISIS GARANTIZADO :

Acido Fosfórico disponible(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ).....	25%
Calcio (Ca).....	10%
Magnesio (Mg).....	5.5%
Zinc (Zn).....	5.5%

\*Derivados de fosfatos complejos metálicos.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. USESE DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE ESTA ETIQUETA.**

### MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCION:** Es dañino si se ingiere

**Manifestación de Garantía:** La garantía del vendedor estará limitada en los términos de la Etiqueta. El comprador está sujeto a asumir los riesgos de uso y manejo y aceptará el producto En estas condiciones.

### RECOMENDACIONES GENERALES

**CITRICOS:** Aplicación aérea ó aspersión de 10-15 kg/ Ha por aplicación en 60 a 400 Lts de agua. Con equipo terrestre, de 2-4 kg por 400 Lts de agua cubriendo totalmente el follaje. (hasta 20 kg/Ha Por aplicación).

**AGUACATES:** de 2.5-5 kg por cada 400 Lts cubriendo bien el folleje. En aplicación aérea o terrestre aplicar de 10-20kg/Ha por aplicación (no exeder).

**AJO Y CEBOLLA:** de 3-8 kg /Ha por aplicación.

**DURAZNOS, CIRUELAS, NECTARINAS, Etc.:** 5-20 kg/Ha por aplicación. (No aplicar dentro de las 3 semanas a cosecha debido al residuo visible)

**MANZANAS Y PERAS:** 5-20 kg/Ha por aplicación en aspersiones de pre y post floración. Repita según se requiera. Aplicación de Post-Cosecha 10-20 kg /Ha por aplicación.

**LECHIUGA, APIO Y VERDURA DE HOJA:** 2-8 kg/Ha por aplicación. Haga varias aplicaciones con Intervalos de 2 a 3 semanas iniciando en el deshoje o raleo.

**MELONES, PEPINOS Y OTRAS CUCURBITACEAS:** 2-10 kg/Ha por aplicación. Haga dos aplicaciones a intervalos 2 a 3 semanas inciando justo antes de la floración.

**TOMATES Y CHILES:** 3-8 kg/Ha por aplicación en la suficiente agua para dar una distribución uniforme del material. Se recomiendan de 1 a 3 aplicaciones con intervalos de 3 a 4 semanas, iniciando en el período previo a la floración.

**VID:** de 5-12 kg/Ha por aplicación. Primera aplicación cuando los brotes esten en el estadio de 4-6 Hojas, repetir según necesidad

**Peso neto 11.35 kg (25 Lb)**

**IMPORTADO POR: Fertilzona de México S.A. de C.V. , Km 271.6-FN La Victoria**  
Hermosillo, Sonora. FME920608-E98 Tel. (62) 800-121 • 800-129, Fax (62)800-089

