



HoloCaI™

Nutriente ultramicronizado

Análisis garantizado:

Calcio (Ca)7%
Boro (B) 0.02%

Derivado de:

Carbonato de calcio, octaborato disódico

Contenido neto:

- 1 galón (3.78L)
10.02 lbs (4.5 kg)
- 5 galón (18.92L)
50.1 lbs (22.7 kg)
- 30 galón (113.56L)
300.6 lbs (136.3 kg)
- 55 galón (208.2L)
551.1lbs (250 kg)
- 275 galón(1041L)
2755.5 lbs (1249 kg)

Densidad: 10.02 lbs. por galón a 68° F

F2315

Información sobre los contenidos y niveles de metales en este producto está disponible en Internet en <http://www.aapfco.org/metals.html>

Descargo de responsabilidad: Los productos de AEA se venden "tal cual" y todas las garantías, expresas o implícitas, se declinan. En ningún caso AEA o sus filiales serán responsables de ningún daño de ningún tipo por el almacenamiento o uso de este producto. El comprador asume toda la responsabilidad por el uso de cualquier producto AEA.

Este producto está diseñado para su uso de acuerdo con un plan de sistema orgánico aprobado. Todos los materiales cumplen con las reglas del Programa Orgánico Nacional (NOP) del USDA para la producción certificada de cultivos orgánicos. Verifique con su certificador antes de usar.

FINALIDAD: HoloCaI™ es una fuente de calcio y boro.

TASAS DE APLICACIÓN Y TEMPORIZACIÓN

HoloCaI™ está diseñado para aplicaciones foliares, de suelo o de fertirrigación y solo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Consulte con su consultor de cultivos para conocer las tarifas de aplicación específicas.

Suelo: Aplicar hasta 2 galones por acre en las etapas apropiadas de crecimiento de la planta.

Foliar: Aplicar hasta 1 galón por acre en las etapas apropiadas de crecimiento de la planta.

Fertigación: Aplicar hasta 1 galón por acre en las etapas apropiadas de crecimiento de la planta.

ADVERTENCIA: Algunos cultivos pueden resultar heridos por la aplicación excesiva de boro.

Manipulación: Almacenar en un área fría y seca fuera de la luz solar directa. Este producto ha sido probado para almacenar de forma segura hasta 35°F. La cristalización o sedimentación puede ocurrir por debajo de 35°F o por encima de 95°F. Agitar o agitar antes de usar. No mezclar ni almacenar en forma diluida. Utilice siempre el producto dentro de las 8 horas posteriores a la dilución.

Al mezclar el tanque: Se recomienda una prueba de frasco: Preparar una pequeña cantidad de la mezcla propuesta y permitir que se ponga de pie en un frasco de vidrio durante la noche observando signos de incompatibilidad. Idealmente, una muestra de la mezcla de ensayo debe ser rociada en una pequeña área del cultivo objetivo y observada durante 3 a 4 días para cualquier efecto fitotóxico. La agitación es la clave para la usabilidad de este producto. Los productos AEA implican partículas diminutas que son demasiado pequeñas para obstruir los filtros; sin embargo, si no están adecuadamente diluidos o agitados antes y durante la aplicación existe la posibilidad de problemas con el equipo de pulverización. Considere el uso de una boquilla de educor para agitar antes de su uso. No se puede garantizar la compatibilidad y/o el rendimiento cuando se combina con otros productos.



Advancing Eco Agriculture, LLC

4551 Parks West Road, Middlefield, OH 44062
www.advancingecoag.com • 800-495-6603