



HoloPhos™

Análisis garantizado: 0-7-0

Fosfato disponible (P_2O_5)..... 7%
Calcio (Ca) 7%

Derivado de: Fosfato roca

TAMBIÉN CONTIENE INGREDIENTES

ALIMENTICIOS NO VEGETALES:

Ácido húmico al 0,1% (derivado de la leonardita)

- 1 galón (3,78l) 55 galones (208,2l)
 5 galones (18,92l) 275 galones
 30 galones (113,56l)

Densidad: 10,4 libras por galón a 68°F

Volumen: 1 galón (3,78l)

La información referente a los contenidos y niveles de metales en este producto está disponible en Internet en <http://www.aapfco.org/metals.htm>

Este producto está destinado para su uso de acuerdo con un plan de sistema orgánico aprobado. Todos los materiales cumplen con la normativa del Programa Orgánico Nacional (NOP, *National Organic Program*) de USDA y otras regulaciones bio orgánicas internacionales para la producción de cultivos orgánicos certificados. Verifique con su certificador antes de usar.

Frecuencia y régimen de aplicación

Este material está destinado para la aplicación foliar y debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Finalidad del producto: Este producto proporciona fósforo para la salud general y nutrición de la planta.

Frutas y vegetales: Como foliar y/o en irrigación, aplique a una tasa de 1-2 cuartos de galón por acre, cada 7-14 días como parte de un programa integral de fertilización.

Cultivos de campos extensos: Como fertilización base para iniciar el cultivo o cerca de las raíces, puede aplicarse a una tasa de 4-8 cuartos de galón por acre, dependiendo del análisis del suelo. Como foliar, aplicar 2-4 cuartos de galón por acre en los estadios apropiados del crecimiento de la planta.

El tamaño máximo de las partículas objetivo contenidas en este producto es 100 μ m. Usar mallas de aspersion apropiadas. **Manipulación:** Almacenar en un área seca y fresca, lejos de la luz directa del sol. Este producto ha sido evaluado para ser almacenado de manera segura hasta 35°F. Por debajo de los 35°F o por encima de los 95°F puede ocurrir la cristalización o la sedimentación. Batir

o agitar antes de usar, especialmente cuando esté casi vacío para disolver el residuo en el fondo del tambor/frasco. No pre-mezclar o almacenar de forma diluida. Siempre usar el producto dentro de las 8 horas de su dilución. Todos los aspersores foliares tienen un mejor rendimiento cuando se aplican temprano por la mañana o tarde al anochecer.

Cuando se mezcle en tanque: Se recomienda una prueba de frasco: Preparar una pequeña cantidad de la mezcla propuesta y dejarla reposar en un frasco de vidrio durante la noche, observando a fin de detectar signos de incompatibilidad. Idealmente, luego debe rociarse una muestra de la mezcla de prueba sobre un área pequeña del cultivo objetivo y observarse durante 3 a 4 días a fin de detectar efectos fitotóxicos. La agitación es la clave para la usabilidad de este producto. Los productos de AEA involucran partículas minúsculas que son demasiado pequeñas como para obstruir los filtros; sin embargo, si son diluidas o agitadas inadecuadamente antes y durante la aplicación existe una posibilidad de que surjan problemas con el equipamiento de aspersion. Considerar el uso de una boquilla euductora para agitar antes de usar. No pueden garantizarse la compatibilidad y/o rendimiento cuando se combina con otros productos.

Exención de responsabilidad: Los productos AEA se venden "tal como se encuentran" y se eximen de toda garantía expresa o implícita. AEA o sus filiales no serán responsables en caso alguno por ninguna clase de daño por la conservación y uso de este producto. El comprador asume toda responsabilidad por el uso de cualquier producto AEA.



Advancing Eco Agriculture, LLC

4551 Parks West Road, Middlefield, OH 44062
www.advancingecoag.com • 800-495-6603