



PhotoMag™

Análisis garantizado:

Magnesio (Mg).....	1%
1% Magnesio soluble en agua (Mg)	
Azufre (S)	1%
1% Azufre Combinado (S)	
Boro (B)	0.6%
Cobalto (Co)	0.02%
Molibdeno (Mo)	0.02%

Derivado de: Sulfato de magnesio, sulfato de cobalto, octaborato disódico, agua de mar concentrada, molibdato de sodio

Contenido neto:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 galón (3.78L)
9.24 lbs. (4.19 kg) | <input type="checkbox"/> 55 galón (208.2L)
508.2 lbs. (230.5 kg) |
| <input type="checkbox"/> 5 galón (18.92L)
46.2 lbs. (20.9 kg) | <input type="checkbox"/> 275 galón (1041L)
2541 lbs. (1152.5 kg) |
| <input type="checkbox"/> 30 galón (113.56L)
277.2 lbs. (125.7 kg) | |

Densidad: 9.24 lbs. por galón a 68°F
F2315

Información sobre los contenidos y niveles de metales en este producto está disponible en Internet en <http://www.aapfco.org/metals.html>

Descargo de responsabilidad: Los productos de AEA se venden "tal cual" y todas las garantías, expresas o implícitas, se declinan. En ningún caso AEA o sus filiales serán responsables de ningún daño de ningún tipo por el almacenamiento o uso de este producto. El comprador asume toda la responsabilidad por el uso de cualquier producto AEA.

Este producto está diseñado para su uso de acuerdo con un plan de sistema orgánico aprobado. Todos los materiales cumplen con las reglas del Programa Orgánico Nacional (NOP) del USDA para la producción certificada de cultivos orgánicos. Verifique con su certificador antes de usar.

FINALIDAD: PhotoMag™ es una fuente de magnesio, azufre, boro, cobalto y molibdeno.

TASAS DE APLICACIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Este producto está destinado a la aplicación foliar o fertirrigación y debe utilizarse sólo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Forrajes: Aplicar hasta 6 cuartos por acre, 10-14 días después de cada corte.

Frutas y verduras: Como foliar y/o en riego, aplicar hasta 1 galón por acre, cada 7-14 días.

Cultivos de acre ancho: Como un entrante de fila o vestido lateral, aplicar hasta 2 galones por acre, basado en el análisis del suelo. Como foliar, aplicar hasta 1 galón por acre.

Precaución: Algunos cultivos pueden resultar heridos por la aplicación excesiva de boro.

Precaución: La aplicación de fertilizantes que contengan molibdeno puede dar lugar a cultivos forrajeros que contengan niveles de molibdeno que sean tóxicos para los animales de rumia.

Propuesta 65 de California: Advertencia: Este producto contiene un material (sulfato de cobalto) conocido por el estado de California para causar cáncer

Manipulación: Almacenar en un área fría y seca fuera de la luz solar directa. Este producto ha sido probado para almacenar de forma segura hasta 35°F. La cristalización o sedimentación puede ocurrir por debajo de 35°F o por encima de 95°F. Agitar o agitar antes de usar. No mezclar ni almacenar en forma diluida. Utilice siempre el producto dentro de las 8 horas posteriores a la dilución.

Al mezclar el tanque: Se recomienda una prueba de frasco: Preparar una pequeña cantidad de la mezcla propuesta y permitir que se ponga de pie en un frasco de vidrio durante la noche observando signos de incompatibilidad. Idealmente, una muestra de la mezcla de ensayo debe ser rociada en una pequeña área del cultivo objetivo y observada durante 3 a 4 días para cualquier efecto fitotóxico. La agitación es la clave para la usabilidad de este producto. Los productos AEA implican partículas diminutas que son demasiado pequeñas para obstruir los filtros; sin embargo, si no están adecuadamente diluidos o agitados antes y durante la aplicación existe la posibilidad de problemas con el equipo de pulverización. Considere el uso de una boquilla de educor para agitar antes de su uso. No se puede garantizar la compatibilidad y/o el rendimiento cuando se combina con otros productos.



Advancing Eco Agriculture, LLC

4551 Parks West Road, Middlefield, OH 44062
www.advancingecoag.com • 800-495-6603